

بررسی سبک زندگی معلمان شاغل در شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۸

عبدالرحمان چرکزی^۱، قربان محمد کوچکی^۲، حسین شهنازی^۳، زلیخا اکرامی^۴، الیاس بهادر^۵

چکیده

مقدمه: سبک زندگی، فعالیت عادی و معمول روزانه است که افراد آنها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته‌اند که بر روی سلامتی افراد تأثیر می‌گذارند. این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی معلمان شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.

روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی، ۳۳۶ معلم به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- خوشای در مقاطع ابتدایی راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی انتخاب شدند. اطلاعات با پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با نرم‌افزار آماری SPSS ۱۱/۵ با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آزمون من ویتنی، t مستقل، کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تعزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب اطمینان ۹۵ درصد در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در این پژوهش ۲۶۸ نفر (۸۴ درصد) دارای سبک زندگی نیمه مطلوب بودند. ۱۴ نفر (۴/۲ درصد) افراد سیگاری ۸۰ نفر (۲۳/۶ درصد) به طور مرتب ورزش می‌کردند. ۱۸۱ نفر (۵۴ درصد) دارای اضافه وزن یا چاقی بر اساس معیار نمایه توده بدنی بودند. ۱۴۸ نفر (۴۴/۱ درصد) افراد در زمینه تغذیه سالم و ۲۳۹ نفر (۷۱/۱ درصد) نیز در زمینه تغذیه غیرسالم دارای وضعیت مطلوب بودند. ۳۰۲ نفر (۸۲/۹ درصد) در زمینه کنترل استرس در وضعیت نیمه مطلوب بودند. بین سبک زندگی و متغیر مقطع تدریس ($p=0.05$) و بین انجام ورزش مرتب و جنسیت رابطه معنی‌دار مشاهده شد ($p=0.002$).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه اکثریت افراد مورد بررسی دارای سبک نیمه مطلوب و غیر مطلوب بودند مداخله سازمان یافته و گستردگی منطبق با شرایط افراد مورد بررسی ضروری به نظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، کنترل استرس، معلم، گرگان.

نوع مقاله: تحقیقی

پذیرش مقاله: ۱۹/۴/۲۹

دریافت مقاله: ۱۹/۳/۲۷

مقدمه

اصطلاح سبک زندگی، نظریه به نسبت شایعی است که بیشتر اوقات برای اشاره به روش زندگی مردم به کارمی‌رود و بازتاب دامنه کامل ارزش‌های اجتماعی، طرز بروخورد و

فعالیت‌ها است. سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی درسراسر زندگی می‌باشد، که در طی آن فرآیندهای اجتماعی شدن به وجود آمده است. سبک زندگی از طریق روابط متقابل فرد با والدین، دوستان، خواهر و

۱- دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده پرایزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

۲. مریب، کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پرایزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران (نویسنده مسؤول)

Email: ghkoochaki@yahoo.com

۳. دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۴. کارشناس پرستاری، مرکز آموزشی درمانی پنجم اذر گرگان، گرگان، ایران.

۵. کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، گروه اتاق عمل، دانشکده پرایزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

ملی و در کل بشری و شناخت عوامل بنیادی تربیت نسل‌ها در جامعه رنگ و جلای مخصوصی می‌بخشد و به توسعه و رشد مسائل آموزش بهداشت و مسائل اقتصادی کشور کشیده شده است و هیچ وسیله‌ی دیگری نمی‌تواند از این لحاظ جای او را بگیرد و معلم همواره به عنوان مؤثرترین عامل تعلیم و تربیت جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. در این میان نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش‌آموزان بسیار مهم جلوه می‌کند چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی‌اند، نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا است. برای مردم‌با توجه به نقش تعیین کننده متغیر سبک زندگی در حفظ و ارتقاء سلامت و افزایش کیفیت زندگی و به دلیل نقش حساس معلمان به عنوان نیروی انسانی تأثیرگذار در توسعه و تکامل جامعه و الگوپذیری دانش‌آموزان از آنان و نبود اطلاعات لازم از سبک زندگی معلمان در شهرستان گرگان، این پژوهش با هدف بررسی سبک زندگی درین آنان طراحی گردید.

روش‌ها

در این مطالعه توصیفی - تحلیلی ۳۳۶ معلم به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - خوشای انتخاب شدند، به این صورت که جامعه پژوهش به ۳ طبقه ابتدایی، راهنمایی، و متوسطه و پیش‌دانشگاهی تقسیم شده و از آنجا که در سطح شهرستان گرگان ۱۹۸ آموزشگاه ابتدایی، ۱۶۳ مدرسه مقطع راهنمایی، ۱۶۸ دبیرستان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی وجود داشت و بر اساس اطلاعات موجود در هر آموزشگاه به طور میانگین تعداد ۲۰ معلم شاغل بودند. از طرفی در کل آموزشگاه‌های شهرستان گرگان حدود ۱۰۵۸۰ نفر معلم وجود داشت، بر اساس تناسب طبقات سه گانه مقاطع تحصیلی خوشها انتخاب و ۱۶۸ نفر از معلمان مقطع ابتدایی، ۱۳۸ نفر معلم مقطع راهنمایی، ۱۴۴ نفر از معلمان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی وارد مطالعه شدند. بنابراین برای مقطع ابتدایی ۹ خوش، برای مقطع راهنمایی

برادر، افراد هم سن و سال و از طریق مدارس و رسانه‌های جمعی آموخته می‌شود (۱). سلامتی مستلزم ارتقاء سبک زندگی بهداشتی است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که بین سلامتی و سبک زندگی افراد ارتباط و همبستگی وجود دارد. بسیاری از مشکلات بهداشتی امروزی مانند چاقی، اختلالات قلبی‌عروقی، سرطان ریه، اعتیاد و بیماری‌های منتقله از راه تماس جنسی و ... با دگرگونی‌های سبک زندگی در رابطه است (۱). بیش از یک‌سوم کل موارد مرگ و میر در دنیا، به دلیل چند رفتار تهدیدکننده سلامتی می‌باشد که ناشی از نادرستی سبک زندگی فردی و اجتماعی است. مهم‌ترین آن‌ها شامل رژیم غذایی نامناسب، کمی فعالیت بدنی، استعمال سیگار و رفتار جنسی نامناسب می‌باشد (۲). دو عامل رژیم غذایی نامناسب و بی‌تحرکی، اصلی‌ترین عوامل خطر در بروز بیماری‌های قلبی، پروفشاری خون، چاقی، دیابت نوع دوم، پوسیدگی دندان‌ها، سکته‌های مغزی و تعدادی از سرطان‌ها می‌باشند و می‌توان با تعدیل رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب از ۸۰ درصد بیماری‌های قلبی و ۹۰ درصد دیابت نوع دوم جلوگیری کرد. همچنین یک‌سوم موارد سرطان‌ها با بهبود تغذیه، کنترل وزن و انجام فعالیت بدنی و یک‌سوم دیگر سرطان‌ها با دوری از مصرف سیگار قابل پیشگیری است (۳). نتایج مطالعه غفاری نژاد نشان داد که معلمان دارای آگاهی کمی در زمینه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت هستند (۴). همچنین نتایج مطالعه عزیز زاده فروزی نشان داد که زنان معلم شهر رفسنجان آگاهی و عملکرد نامناسبی در زمینه رفتارهای سبک زندگی پیشگیری از پوکی استخوان دارند (۵).

یکی از راههایی که می‌توان به هدف پیشگیری از بیماری‌ها رسید استفاده از آموزش‌دهندگان مناسب برای جامعه هدف است در حال حاضر در ایران معلمین از چنین ویژگی برخوردار می‌باشند. مسئولیت معلمان در امر پیشبرد اهداف مقدس تعلیم و تربیت حائز اهمیت فراوان است چون در شرایط عصر حاضر پاسداری از میراث‌های فرهنگی و بهداشتی و تلفیق هدف‌های آموزش و پرورش با آرمان‌های

محاسبه شد به این ترتیب که محدوده نمرات هر فرد بین ۷۵-۲۳ و کسب نمرات زیر ۵۰ درصد به عنوان سبک زندگی غیرمطلوب، نمرات ۵۰-۷۵ درصد به عنوان سبک زندگی نیمه مطلوب و کسب نمرات بالای ۷۵ درصد به عنوان سبک زندگی مطلوب در نظر گرفته شدند. جهت محاسبه نمایه توده بدنی از پاسخ خود نمونه‌ها به اندازه قد و وزن‌شان استفاده گردید.

با هماهنگی مسئولین حوزه سازمان آموزش و پرورش استان، پرسش‌نامه‌ها در حضور مستقیم پرسشگران آموزش دیده و پس از اخذ رضایت شفاهی نمونه‌های پژوهش در فاصله مهر ماه تا آذر ماه سال ۱۳۸۸ تکمیل و جمع‌آوری گردید. SPSS 11/5 اطلاعات جمع‌آوری و داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS و از طریق آمارتوصیفی به صورت توزیع فراوانی و درصد و میانگین و انحراف معیار، آزمون من ویتنی، t مستقل، کروکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح اطمینان ۹۵ درصد در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

میزان پاسخ‌گویی ۳۳۶ نفر (۷۴/۷ درصد) از ۴۵۰ نفر بود. از ۳۳۶ فرد مورد بررسی ۱۴۲ نفر (۴۲/۳ درصد) مرد و ۱۹۴ نفر (۵۷/۷ درصد) زن بودند. دامنه سنی افراد مورد بررسی ۲۲ تا ۶۲ سال با میانگین سنی $41/63 \pm 7/41$ سال و سابقه کار ۱۸/۵۷ $\pm 7/34$ سال بود. میانگین و انحراف معیار وزن، قد و نمایه توده بدنی (Body Mass Index) به ترتیب برابر با $73/09 \pm 12/08$ کیلوگرم، $166/83 \pm 9/58$ سانتی‌متر و $26/28 \pm 3/82$ بود. میانگین و انحراف معیار بعد خانوار برابر با $3/88 \pm 1/28$ نفر بود. محل سکونت ۳۱۷ نفر (۹۴/۳ درصد) شهر، ۱۳ نفر (۳/۹ درصد) روستا و ۶ نفر (۱/۸ درصد) نیز نامشخص بود. فراوانی مقطع تدریس، میزان تحصیلات و وضعیت استخدام افراد مورد بررسی در (جدول شماره ۱)

۷ خوش، برای مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی ۸ خوش در نظر گرفته شد.

ابزارسنجش، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر دو بخش بود: سوالات دموگرافیک و سوالات مرتبط به سبک زندگی که خود شامل چهار قسمت (استفاده از کمربند ایمنی، استعمال سیگار، وضعیت تغذیه، فعالیت بدنی و شیوه‌های مقابله با استرس) بود. پایایی این پرسش‌نامه را سلیمانی نژاد و باختنی در مطالعات خود بر روی دانشجویان از طریق آزمون ثبات درونی به ترتیب $\alpha = 0.82$ و $\alpha = 0.86$ گزارش کردند (۶). در مطالعه پایلوت که بر روی ۲۵ نفر از معلمان انجام شد پایایی این پرسش‌نامه در بخش وضعیت تغذیه سالم برابر با $\alpha = 0.75$ ، در بخش تغذیه ناسالم برابر با $\alpha = 0.69$ ، در بخش تحرک در حین تدریس برابر با $\alpha = 0.72$ و در بخش کنترل استرس برابر با $\alpha = 0.84$ بدست آمد.

در ارتباط با استفاده از کمربند ایمنی دو سوال با پاسخ هرگز، بندرت، اغلب اوقات و همیشه بود. در زمینه استعمال دخانیات یک سوال با جوابی به صورت بلی و خیر و در ادامه تعداد نخ‌های سیگار روزانه پرسیده شد. فعالیت بدنی دارای دو بخش فعالیت بدنی هنگام تدریس و انجام ورزش مرتب در طول هفته بود. فعالیت بدنی هنگام تدریس نظیر نشستن یا ایستادن در هنگام تدریس و در زنگ تفریج و در بین ساعت‌های تدریس با سه سوال با پاسخ‌هایی از محدوده هرگز تا همیشه بود. در زمینه تغذیه سوالات به دو بخش: (الف) بخش تغذیه سالم (سؤال ۷) با پاسخ‌های چهارگانه هرگز تا همیشه بود و به ترتیب از ۱ تا ۴ نمره داده شد (ب) بخش تغذیه غیر سالم (سؤال ۵) با پاسخ‌های بلی و خیر بودند و به سوالات بلی نمره ۱ و به سوالات خیر نمره ۲ داده شد. سوالات بخش کنترل استرس شامل ۷ سوال با پاسخ‌های هرگز تا همیشه با امتیاز به ترتیب از ۱ تا ۴ بود. به سوالات معکوس نمره دهی معکوس داده شد. با جمع نمرات بخش‌های سوالات فعالیت بدنی هنگام تدریس، انجام ورزش، تغذیه سالم و غیرسالم و کنترل استرس نمره کل

درصد	تعداد	هنگام رانندگی
۰/۹	۳	هرگز
۶/۵	۲۲	گاهی
۱۵/۸	۵۳	اغلب اوقات
۷۴/۷	۲۵۱	همیشه
۲/۱	۷	رانندگی نمی‌کنم
۱۰۰	۳۳۶	جمع
		هنگام سرنشین جلو خودرو بودن
۲/۳	۱۱	هرگز
۲۹/۸	۱۰۰	گاهی
۲۷/۴	۹۲	اغلب اوقات
۳۷/۸	۱۲۷	همیشه
۱/۸	۶	اظهار نشده
۱۰۰	۳۳۶	جمع

در ارتباط با وضعیت مصرف سیگار ۳۱۶ نفر (۹۴ درصد) اظهار کردند که سیگاری نیستند و ۱۴ نفر (۴/۲ درصد) نیز سیگاری بودند. ۶ نفر (۱/۸ درصد) نیز به این سؤال پاسخ ندادند. همه افراد سیگاری مربوط به جنس مذکور بود. افراد مورد بررسی بطور متوسط $۱/۵۱ \pm ۲/۴۳$ ساعت در طول روز تلویزیون یا ویدئو تماشا می‌کنند و $۳۵/۱۱ \pm ۴۷/۹۹$ دقیقه نیز در طول روز برای رفتن به مدرسه، خرید و ... پیاده روی می‌کنند. ۱۹۹ نفر (۵۲/۲ درصد) نیز گفته‌اند که در اصل ورزش نمی‌کنند و ۱۳۷ نفر (۴۰/۸ درصد) ورزش می‌کردند و که از بین کل افراد مورد بررسی فقط ۲۳/۶ درصد به طور مرتب (۳ روز یا بیشتر در هفتگه) ورزش می‌کنند. بر اساس آزمون من ویتنی بین انجام ورزش و جنسیت رابطه معنی‌داری پیدا شد ($p=0.002$). به این معنی که مردان به طور معنی‌داری بیشتر از زنان ورزش مرتب انجام می‌دادند. مهم‌ترین موانع انجام ورزش به ترتیب نداشتن وقت و مشغله زندگی (۳۹ درصد)، کم حوصلگی (۱۷/۵ درصد)، نداشتن دوست و همراه (۹/۸ درصد) بود و ۲۹/۷ درصد نیز پاسخی به این سؤال نداده بودند. در کل یک نفر سبک زندگی غیرمطلوب، ۸۴ درصد افراد مورد

جدول ۱: توزیع فراوانی مقطع تدریس، رابطه استخدامی و میزان تحصیلات معلمان مورد بررسی شهرستان گرگان در

سال ۱۳۸۸

متغیر	درصد	تعداد
مقطع ابتدایی	۳۰/۱	۱۰۱
مقطع راهنمایی	۳۶/۹	۱۲۴
مقطع دبیرستان	۲۶	۱۱۱
رسمی	۸۶/۹	۲۹۲
پیمانی	۲/۳	۱۱
رابطه استخدامی	۶/۸	۲۲
حق التدریس	۲	۱۰
سایر	۴/۵	۱۵
دیپلم	۲۲/۷	۱۱۰
فوق دیپلم	۵۵/۶	۱۸۷
تحصیلات لیسانس	۶/۳	۲۱
فوق لیسانس	۰/۹	۴
نامشخص		

میانگین و انحراف معیار ساعت خواب شب‌نه روزی افراد مورد بررسی برابر با $۷/۳۲ \pm ۱/۲۳$ ساعت بود. ۱۳۶ نفر (۴۰/۵ درصد) ذکر کردند که در بین ساعت روز می‌خوابند، ۱۴۹ نفر (۴۴/۳ درصد) نیز گفته‌اند که اکثر اوقات می‌خوابند، ۴۷ نفر (۱۴ درصد) نیز اظهار کردند که هیچ وقت خواب نیمروزی ندارند و ۴ نفر (۱/۲ درصد) نیز به این سؤال پاسخ نداده بودند. میانگین خواب درین ساعت روز نیز $۷۴/۴ \pm ۶۰/۸۰$ دقیقه بდست آمد. در هنگام رانندگی (۳۷/۸ درصد) افراد مورد بررسی اذعان داشتند که همیشه از کمربند اینمی استفاده می‌کنند ولی این مقدار در هنگام رانندگی (۱۷/۵ درصد) نیز به این سؤال پاسخ نداده بود (جدول شماره ۲).

جدول ۲: توزیع فراوانی سبک زندگی در ارتباط به استفاده از کمربند اینمی در هنگام رانندگی و هنگام سرنشین جلو خودرو بودن معلمان مورد بررسی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۸

وضعیت بهتری داشتند. آزمون کروسکال والیس بین سبک زندگی معلمان و میزان تحصیلات معلمان ($p=0.112$) و وضعیت استخدام ($p=0.598$) ارتباط معنی‌دار آماری را نشان نداد.

میانگین BMI مردان برابر با $26/30 \pm 3/49$ و زنان برابر با $26/27 \pm 4/07$ بود که بر اساس آزمون t مستقل بین دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشد ($p=0.950$). در ارتباط با تغذیه سالم و فعالیت بدنی هنگام تدریس زنان نسبت به مردان به طور معنی‌داری وضعیت بهتری داشتند در حالی که مردان در ارتباط با تغذیه ناسالم و کنترل استرس به طور معنی‌داری وضعیت بهتری نسبت به زنان داشتند (جدول شماره ۴).

بررسی سبک زندگی نیمه مطلوب و $15/7$ درصد دارای سبک زندگی مطلوب بودند (جدول شماره ۳).

ضریب همبستگی پیرسون بین سن و سبک زندگی ارتباط معنی‌داری را نشان نداد ($r=0.085$). ولی بین سابقه کار معلمان و سبک زندگی ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید ($p=0.009, r=0.15$). به این معنی که با افزایش سابقه کار معلمان وضعیت سبک زندگی آنان بهبود می‌یافتد. میانگین انحراف معیار نمره سبک زندگی معلمان مقاطع ابتدایی برابر با $54/37 \pm 5/16$ برای مقطع راهنمایی $52/86 \pm 4/37$ و برای مقطع دبیرستان این مقدار برابر با $53/25 \pm 4/27$ بود که بر اساس آزمون کروسکال والیس انجام شده این مقدار از نظر آماری معنی‌دار بود ($p=0.05$) یعنی معلمان ابتدایی نسبت به معلمان راهنمایی و دبیرستان از نظر سبک زندگی

جدول ۳: توزیع فراوانی سبک زندگی فعالیت بدنی و تحرک هنگام تدریس، سبک زندگی در ارتباط با تغذیه سالم، سبک زندگی در ارتباط با تغذیه غیر سالم و وضعیت کنترل استرس در معلمان مورد بررسی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۸

متغیرهای سبک زندگی	غيرمطلوب				مطلوب		کل
	نیمهمطلوب	تعداد درصد					
فعالیت هنگام تدریس	۲۹/۲	۹۸	۶۹/۹	۲۱۴	۳/۹	۱۲	۲۲۵
تغذیه سالم	۲/۴	۸	۵۱/۸	۱۷۴	۴۴/۱	۱۴۸	۲۳۰
تغذیه غیرسالم	۵/۱	۱۷	۲۳/۸	۸۰	۷۱/۱	۲۲۹	۲۳۶
کنترل استرس	۷/۱	۲۴	۸۲/۹	۳۰۲	۱/۸	۶	۲۳۲
کل سبک زندگی	۰/۳	۱	۸۴	۲۶۸	۱۵/۷	۵۰	۲۱۹

جدول شماره ۴: میانگین و انحراف معیار نمره زنان و مردان به تفکیک اجزای سبک زندگی در معلمان مورد بررسی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۸

اجزای سبک زندگی	مردان	زنان	سقف نمره	p-value
فعالیت بدنی هنگام تدریس	۶/۷۸ ± ۱/۳۰	۷/۱۴ ± ۱/۲۴	۱۲	۰/۰۴۵
تغذیه سالم	۲۰/۱۸ ± ۳/۲۶	۲۱/۶۶ ± ۳/۰۰	۲۸	۰/۰۰۱
تغذیه ناسالم	۸/۶۲ ± ۱/۲۳	۸/۰۰ ± ۱/۵۲	۱۰	۰/۰۰۱
کنترل استرس	۱۷/۶۹ ± ۱/۹۵	۱۶/۶۴ ± ۱/۹۵	۲۸	۰/۰۰۱

سبک زندگی نیمه مطلوب و حدود 15 درصد دارای سبک زندگی مطلوب بودند. حفظ سلامتی و ارتقای آن مستلزم سبک زندگی سالم است. اهمیت سبک زندگی سالم بیشتر از آن جهت می‌باشد که روی کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری‌ها مؤثر است بنابراین برای حفظ و ارتقای سلامتی تعديل،

بحث
سبک زندگی فعالیت عادی و معمول روزانه است که افراد آنها را در زندگی خود بطور قابل قبول پذیرفته‌اند به طوری که این فعالیت‌ها روی سلامتی افراد تأثیر می‌گذارند (۸، ۹). نتایج این تحقیق نشان داد که حدود چهار پنجم افراد مورد بررسی دارای

همچنین در مطالعه حاضر بین انجام ورزش و جنسیت ارتباط معنی‌داری مشاهده شد به این معنی که میزان فعالیت بدنی در زنان کمتر از مردان بود. با توجه به اینکه بیماری خاموش پوکی استخوان که در زنان شیوع بیشتری دارد انجام ورزش و فعالیت فیزیکی مرتب جهت پیشگیری از این بیماری در زنان ضروری به نظر می‌رسد. نتایج تحقیقات نشان داده است که تنفسیه و فعالیت بدنی نقش مهمی در تراکم معدنی استخوان دارند (۱۳).

بر اساس شاخص BMI حدود ۵۴ درصد نمونه‌ها دارای اضافه وزن یا چاقی بودند که این می‌تواند وضعیت سلامتی افراد را تحت تأثیر قراردهد. چاقی و اضافه وزن در پی عدم تحرک و تنفسیه ناسالم یکی از عوامل خطرناک در بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، انواع سرطان‌ها به خصوص سرطان کولون و سینه و ... است. در پژوهشی نتایج نشان داد که نزدیک به ۶۹ درصد از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دارای اضافه وزن یا چاقی بودن (۱۴). که بیشتر از مطالعه فعلی است. در مطالعه دیگر در سال ۱۳۸۰ روی ۸۸۰۰ نفر از زنان و مردان ۴۵–۶۰ ساله کشور نتایج نشان داد که ۵۹/۸ درصد جامعه ایرانی مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند (۱۴). در ۱۰ سال گذشته با وجود کاهش دریافت انرژی میزان ابتلا به چاقی در کشورمان ۱۵ درصد افزایش یافته است که مشکل اساسی کاهش تحرک و فعالیت فیزیکی می‌باشد. (۱۴). برهانی‌زاد و همکاران نیز در مطالعه خود بین شاخص توده بدنی و نمره سبک زندگی ارتباط معنی‌دار معکوسی را پیدا کردند و ارتباط معنی‌دار مثبتی بین میزان BMI و سوء مصرف مواد و غذای چرب مشاهده کردند (۱۵).

حدود ۵۵ درصد نمونه‌ها زمینه تنفسیه سالم سبک زندگی نیمه مطلوب و غیر مطلوبی داشتند. انحراف از رژیم غذایی مناسب از یک سو منجر به کمبود مواد غذایی و بیماری‌های ناشی از سوء تنفسیه می‌شود و از سوی دیگر با زیاده‌روی در مصرف چربی‌ها، انواع گوشت، شکر و نمک همراه است که خود عاملی در بروز بیماری‌های مزمن و تحلیل بر می‌باشد. این عقیده وجود دارد که بسیاری از بیماری‌های مزمن مانند بیماری

تصحیح و بهبود سبک زندگی ضروری است. مطالعات انجام شده نشان داده است که بالغ بر ۵۳ درصد علل مرگ‌ومیر افراد جامعه با سبک زندگی آن‌ها ارتباط دارد (۹). بسیاری از مشکلات بهداشتی از قبیل چاقی، بیماری‌های قلبی و عروقی، انواع سرطان و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به چشم می‌خورد با دگرگونی‌های سبک زندگی افراد آن جامعه ارتباط دارد (۱). سبک زندگی نامناسب همچنین یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز بیماری‌های مزمن از جمله سرطان کولون، فشارخون بالا، سیروز، زخم معده، ایدز است (۱۰).

با توجه به نتایج بدست آمده و همچنین روند تأثیر آرام و بدون سرو صدای رفتارهای پرخطر مانند عدم تحرک، تنفسیه ناسالم و استرس بالا بر سلامتی، مداخله و اقدام لازم در جهت تعديل و ارتقاء سبک زندگی فعلی افراد مورد بررسی ضروری است. پس از بوجود آمدن مشکلات و بیماری‌های ناشی از نداشتن سبک زندگی سالم، درمان و کنترل آن به طور تقریبی ناممکن بوده و بهترین راه در این زمینه پیشگیری است. برگزاری دوره‌های آموزشی در برنامه‌های بازآموزی معلمان با استفاده از متخصصین امر می‌تواند یکی از راه حل‌ها در این زمینه باشد. نتایج مطالعه انجام شده در شهر تهران بر روی معلمان نشان داد که ۶۷ درصد از آنان آگاهی خوب درباره بیماری‌های قلبی‌عروقی دارند ولی فقط ۲۷/۷ درصد از رژیم غذایی بی‌خطر استفاده می‌کردند (۱۱).

در زمینه انجام ورزش مرتب نتایج نشان داد که فقط حدود یک چهارم نمونه‌ها (۲۳/۶ درصد) به طور مرتب ورزش می‌کردند. در مطالعه انجام شده در تهران نیز ۳۵/۶ درصد معلمان مورد بررسی فعالیت ورزشی مرتب داشتند که بیشتر از مطالعه فعلی است (۱۱). که این تفاوت می‌تواند بدلیل تفاوت فرهنگی و محیطی دو شهر تهران و گرگان باشد. مطالعه دیگری در تهران بر روی دانش آموزان دختر نشان داد که ۵۷/۷ درصد آنان در زمینه فعالیت بدنی و ورزش سبک زندگی نامطلوبی دارند (۱۲).

استفاده می کردند (۲۱). که با مطالعه حاضر هم خوانی ندارد این امر می تواند ناشی از متفاوت بودن جامعه مورد بررسی دو مطالعه فوق باشد. بررسی میزان و سطح استرس افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر و انطباق آن با روش های مقابله ای می توانست کمک کننده باشد که خود از محدودیت این مطالعه به شمار می رود.

در زمینه کمربند اینمی اکثریت افراد مورد بررسی اذعان داشته اند که هنگام رانندگی از کمربند اینمی استفاده می کنند که شیوع استفاده از این امر در سالیان اخیر می تواند به دلیل اجرای بودن قانون استفاده از کمربند اینمی در هنگام رانندگی در کل سطح جامعه و تبلیغات گسترده در این زمینه از طریق رسانه های جمعی باشد.

در زمینه استعمال دخانیات ۴/۲ درصد افراد اذعان داشتند که سیگاری هستند که تمامی آن ها نیز مرد بودند. این میزان نسبت به کل جامعه که در آن شیوع مصرف سیگار ۱۵/۴ درصد است رقم پایینی به حساب می آید اما با توجه به این که استعمال سیگار در بین جامعه فرهنگیان از دید اجتماعی چندان پذیرفته نیست و این که آنان به عنوان افراد مرجع برای دانش آموzan شهر هستند، این مقدار شیوع نیز قابل تأمل می باشد. در مطالعه شهر کرمان این مقدار برابر با ۷/۱ درصد بود (۲۲). که بیشتر از مطالعه فعلی است.

وضعیت سبک زندگی معلمان مقطع ابتدایی نسبت به مقطع راهنمایی بطور معنی داری بهتر بود و از معلمان مقطع دبیرستان اگرچه بالاتر بود ولی این مقدار از نظر آماری معنی دار نبود. این تفاوت در جای خود نیاز به بررسی بیشتری دارد. در مطالعه غفاری نژاد میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در مقاطع تحصیلی با یکدیگر تفاوتی نداشتند (۲۳). در مطالعه کریم زاده شیرازی بهترین کیفیت زندگی مربوط به معلمان مقطع ابتدایی و پایین ترین کیفیت مربوط به معلمان راهنمایی بود (۲۴) که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد.

بین وضعیت تأهل و سبک زندگی ارتباط معنی دار مشاهده نشد ولی در مطالعه غفاری نژاد معلمان متأهل نسبت به معلمان مجرد و بیوه نمره بهتری در رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت

قلبی عروقی، سکته مغزی، دیابت، چاقی و سلطان که سبب ناتوانی ها و مرگ های زودرس می شوند با رژیم غذایی در ارتباطند (۲۵). در مطالعه محمدی بیش از ۵۰ درصد بیماران قلبی چند بار نوشیدنی های شیرین می نوشیدند و ۴۰/۹ درصد میان وعده سالم نداشتند و ۸۸/۶ درصد هیچ گونه تحرک جسمی و ورزشی ندارند و ۹۵/۵ درصد از افراد سبک زندگی نامناسب داشتند (۲۶). بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ۴۱/۳ درصد از کل مرگ ها در کشور ما در سال ۲۰۰۵ ناشی از بیماری های قلبی عروقی بوده و پیش بینی می شود این میزان تا سال ۲۰۳۰ به ۴۴/۸ درصد برسد (۲۷). از طرفی بر اساس آمار حدود یک سوم از بیماری های قلبی ناشی از تغذیه ناسالم و کاهش مصرف میوه و سبزیجات است (۲۸). بنابراین افزایش رفتار تغذیه ای سالم در بین معلمان در جهت پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی می تواند سودمند باشد.

در زمینه کنترل استرس اکثریت قریب به اتفاق نمونه ها از روش ها و استراتژی های نامناسبی برای کنترل و تطابق با استرس استفاده می کرند که این امر می تواند برای سلامتی آنان تهدید کننده باشد زیرا استرس مداوم و طولانی تهدیدی جدی برای کاهش سیستم ایمنی بدن بوده و زمینه ساز انواع بیماری های مزمن نظیر: بیماری های قلبی عروقی، سلطان ها، آسم و ... باشد. استرس و روش های نادرست سازگاری و مقابله با آن در بروز یا تشديد آتروواسکلروز عروق کرونر مؤثر بوده و کسانی که استرس بالایی دارند دو برابر بیشتر از سایر افراد در معرض بیماری های قلبی عروقی قرار می گیرند (۲۹). نتایج مطالعه فرمانبر نشان داد که اکثریت بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی دارای رفتار مقابله با استرس متوسط بوده اند (۲۱). در مطالعه حسن پور دهکردی بر روی بیماران مبتلا به سکته قلبی نتایج نشان داد که ۵۶ درصد دارای سطح استرس بالا قبل از ابتلا به سکته قلبی بوده اند و روش های مقابله با استرس در بین ۶۸/۵ درصد بیماران نامطلوب بوده اند (۲۰). همچنین نتایج نشان داد که مردان نسبت به زنان از روش های مقابله ای بهتری استفاده می کنند ولی در مطالعه فرمانبر زنان از روش های مقابله ای بهتری

بررسی‌ها نتیجه بهتری بدست آورد. از محدودیت‌های این مطالعه میزان عدم پاسخگویی حدود ۱۵ درصدی نمونه‌ها بود که امکان دارد بر روی نتایج سوگراپی ایجاد کرده باشد و استفاده از ابزار پرسش‌نامه که می‌تواند اعتبار مطالعه را کاهش دهد اما با بدون نام بودن پرسش‌نامه‌ها تا حدودی این امر کنترل شد. عدم سنجش رفتار جنسی غیرایمن که از متغیرهای مهم سبک زندگی به حساب می‌آید و عدم سنجش سطح استرس و متغیرهای بیوشیمیابی نظیر سطح چربی خون از دیگر محدودیت‌های این مطالعه بوده‌اند که در صورت سنجش می‌توانستد به اعتبار تحقیق بیفزایند.

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه اکثریت افراد مورد بررسی دارای سبک زندگی نیمه‌مطلوب و غیر مطلوب بودند مداخله سازمان‌یافته و گستردۀ و منطبق با شرایط افراد مورد بررسی ضروری است. برگزاری برنامه‌های بازآموزی در ارتباط با ارتقاء سلامت و بهبود و تعديل سبک زندگی توسط متولیان امر می‌تواند شروعی مناسب در این مسیر باشد.

تشکر و قدردانی

از معاونت فناوری و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ریاست محترم سازمان آموزش پرورش استان گلستان و ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان و همچنین از فرهنگیان عزیز به دلیل شرکت در این پژوهش تقدیر و قدردانی به عمل می‌آید.

دربافت کردند (۴). انتظار می‌رود که افراد مجرد به دلیل مشغله زندگی کمتر نسبت به افراد متأهل از وضعیت بهتری در این زمینه برخوردار باشند. البته بدلیل کم بودن تعداد افراد مجرد در این مطالعه (۲۳ نفر) در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد. بین جنسیت و سبک زندگی نیز ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد اگرچه میانگین نمره زنان بهتر از مردان بود ولی در مطالعه غفاری نژاد میانگین نمره معلمان زن به طور معنی‌داری بیشتر از معلمان مرد بود (۴). همچنین با افزایش سابقه کاری میانگین نمره سبک زندگی به طور معنی‌داری بیشتر شد به نظر می‌رسد با افزایش سابقه کاری که همراه با افزایش سن نیز می‌باشد حساسیت و تهدید در کشیده افراد و راهنمای و محرک‌های عمل افراد نسبت به سلامت و بیماری افزایش یافته و توجه افراد نسبت به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت افزایش می‌یابد. بین میزان تحصیلات و نوع استخدام افراد مورد بررسی نیز با سبک زندگی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد در حالی که انتظار می‌رود با افزایش سطح تحصیلات اطلاعات و دانش افراد نیز افزایش یابد شاید بالا بودن میانگین سطح سواد افراد مورد بررسی از میانگین سواد جامعه در این امر دخیل باشد. در مطالعه غفاری نژاد بین سطح تحصیلات و نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نیز رابطه معنی‌دار مشاهده شد (۴). عدم ارتباط معنی‌دار نمره سبک زندگی افراد مورد بررسی با نوع استخدام شاید به این دلیل که اکثریت قریب به اتفاق افراد به شکل رسمی استخدام بودند، مربوط باشد.

به دلیل در دسترس نبودن نتایج مطالعات مربوط با عنوان تحقیق در بین معلمان بهتر است تحقیقات مشابه و مکمل در سایر نقاط کشور و استان به عمل آید تا بتوان از کل این

References

1. Park JE. Parks textbook of preventive and social medicine. 17th ed. Tehran: Iliya Publication; 2002.
2. WHO. The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneva: World health report 2002 press kit; 2002.
3. WHO. Diet, physical activity and health. Fifty-fifth World Health Assembly, Provisional agenda item 13.11; 2002.
4. Ghaffari Nejad AR, Pouya F. Self promoting behaviors among teachers in Kerman. [persian]. Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences 2002; 11(43): 1-9.

5. Aziz Zadeh Forozi M, Haghdoost AA, Saidzadeh Z, Mohamadalizad S. Study of knowledge and attitude of Rafsanjanian female teachers toward prevention of osteoporosis.[Persian]. Birjand Medical Sciences Journal 2009; 16(1): 71-7.
6. Bakhtari Agdam F. Survey,determination, and comparsion of boys and girls life style who resident in accommodation of Tehran University Medical Sciences.[Thesis in Persian] Tehran University Medical Sciences; 2004.
7. Soleymani Nejad M. The Survey of the little and long acting effects of educational intervention on girls students life style in the accommodation of Tehran University Medical Sciences. [Thesis in Persian] Tehran University Medical Sciences; 2007.
8. Crump A, Marr J, Scurfield M, Darby S. Older People, Nursing & Mental Health. 1st ed. Butterworth-Heinemann; 1999.
9. Montgomery J. Health Care Law. New York: Oxford University Press; 1997.
10. Black JM, Hawks JH, Keene A. Medical Surgical Nursing 2 Volume Text. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2001.
11. Imanipour M, Basampour SS, Haghani HR. Heart disease preventive behaviors and its relationship with knowledge levels of risk factors. [Persian]. Journal of Nursing & Maternity faculty of Tehran University of Medical science 2009; 4(2): 41-9.
12. Rahnvard Z, Zolfaghari M, Kazemnejad A, Zarei L. The relation between female teenagers' life style and osteoporosis prevention. [Persian]. The Journal of Faculty of Nursing and Midwifery 2006; 12(2): 53-61.
13. Hossein Nezhad A, Soltani A, Adibi H, Hamidi Z, Maghbooli Z, Larijani B. Relationship between life style and bone mineral density in men. [Persian]. Journal of Zahedan University of Medical Sciences 2003; 5(1): 13-20.
14. Sharifi A, Amani R, Hamidipour N. Prevalence of Obesity and its Related Lifestyle Pattern in Male Personnel of Jundi-Shapour University of Medical Sciences - 2005. [Persian]. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 2008; 10(3): 235-9.
15. Borhani F, Abbaszadeh A, Kohan S, Golshen S, Dortsaj Raberi E. Correlation between lifestyle and body mass index among young adults in Kerman. [Persian]. Iranian Journal of Nursing Research 2008; 2(6-7): 65-72.
16. Sadeify R. A study to determine the Iraniaian governmental high school students' food habits and their comparsion with food guide pyramid. [Persian]. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 2007; 5(3): 116-21.
17. Mohammadi Zeydi E, Heidar Nia AR, Haji Zadeh E. The study of cardiovascular patient's lifestyle. [Persian]. S 2006; 13(61): 49-56.
18. Menopause. A Resource for Making Healthy Choices. National Institute on Aging. 2002. p. 4-6.
19. Iranian Students News Agency - Tehran. Tenth Congress on Cardiovascular events. [online]. 2008 [cited 2008 Oct 13]. Available Form: URL: <http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1145717>

Lifestyle of Teachers Working in Gorgan City in 2009

**Abdorahman Charkazi¹, Ghorban Mohammad Koochaki², Hosein Shahnazi³,
Zoleikha Ekrami⁴, Elyas Bahador⁵**

Abstract

Background: life style is the ordinal and daily activities of individuals in their own lives that they accepted so, these activities affect their health status. The aim of the current study was to determine teachers' life style in Gorgan city in 2009.

Methods: In a Cross-Sectional study 336 teachers of elementary, mid and high school were recruited through random stratified sampling method. Data gathering instrument was a questionnaire that its validity and reliability approved in other studies. Obtained data analyzed using SPSS software (11.5 ver.) and descriptive and appropriate statistical tests.

Findings: In this study, 268 teachers (84%) had semi favorite life style. 251(74.7%) were used the safety belt when driving. 14(4.2%) was current smoker and 80(23.6%) have regular physical activity. According to Body Mass Index 181 (54%) was obese or overweight. 148 (44.1%) had healthy nutrition and 239 (71.1%) have favorite position in unhealthy nutrition. 302 (82.9%) were in semi favorite position in stress management. There was a significant relationship between life style and teaching category was ($p=0.005$) and between regular physical activity and gender ($p=0.002$).

Conclusion: Because the majority of the people had semi favorite or non favorite life style it is necessity to organize a structured and extensive intervention in consistent with the individual situations.

Key words: Life Style, Stress Management, Teacher, Gorgan.

1- PhD Student, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences and Department of Public Health, School of Paramedicine and Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.

2- Instructor, MSc of Nursing, Department of Surgery Unit, School of Paramedicine and Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran. (Corresponding Author)

Email: ghkoochaki@yahoo.com

3- PhD Student, Department of Health Education and Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4- BSc of Nursing, Azar Fifth Educational and Clinical Center, Gorgan, Iran.

5- MSc of Nursing, Department of Surgery Unit, School of Paramedicine and Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.